

Obvestila za VINOGRADNIŠTVO



KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO

Izdajatelj: KGZS-Zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

Obvestilo pripravil: Domen Bajec, e-pošta: domen.bajec@gov.si

ISSN

št. 09.

Datum: 05. junij 2020

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta pričenja s cvetenjem (60 – 61 po lestvici BBCH).

Ob spremenljivih vremenskih razmerah je nevarnost okužb s *peronosporo vinske trte* velika. Prednost dajemo kombiniram pripravkom kot so **ACROBAT MZ WG** (2,5 kg/ha), **ARMETIL M** (2,5 kg/ha), **RIDOMIL GOLD MZ PEPITE** (2,5 kg/ha), **FOLPAN GOLD** (2 kg/ha; staro ime Ridomil Gold Combi Pepite), **FORTUNA GOLD** (3 kg/ha), **FUDAN GOLD** (3 kg/ha), **MOXIMATE 725 WG** ali **WP** (v času cvetenja 1,9 kg/ha), **MOXIMATE PLUS** (v času cvetenja 1,9 kg/ha), **NAUTILE DG** (2,4 kg/ha), **PROFILUX** (v času cvetenja 2 kg/ha), **REBOOT** (0,4 kg/ha), **CYMBAL** (0,25 kg/ha; priporočeno dodati še dotikalni pripravek), **TWINGO** (3 kg/ha), **TANOS 50 WG** (0,4 kg/ha), **AMPEXIO** (0,5 kg/ha), **PERGADO D** (1,4 l/ha), **PERGADO F** (3 kg/ha), **PERGADO MZ** (2,5 kg/ha), **ORVEGO** (0,8 l/ha), **VALIS F** (1,5 kg/ha), **EMENDO F** (1,5 kg/ha), **VALIS M** (2 kg/ha), **REVUS** (0,6 l/ha),... Pri uporabi sredstev na osnovi A1 – fosetila: **MIKAL FLASH** (4 kg/ha), **MIKAL PREMIUM F** (3 kg/ha), **MOMENTUM F** (4 kg/ha), **MOMENTUM TRIO** (3 kg/ha), **MAGMA TRIPLE WG** (3 kg/ha), **ALLEATO DUO** (odmerek 2 – 3 kg/ha do nastavka plodičev); odsvetujemo dodajanje listnih gnojil na osnovi kovinskih ionov; njihova raba je predvidena 3 × zaporedoma. Proti *oidiju vinske trte* lahko uporabite: **BALTAZAR** (0,4 l/ha), **CUSTODIA** (0,35 l/ha), **NATIVO 75 WG** (0,16 kg/ha), **KUSABI 300 SC** (med cvetenjem 0,25 l/ha), **KARATHANE GOLD 350 EC** (0,6 l/ha,), **TALENDO** (0,25 l/ha),... Smiselno je tudi dodajanje **PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA**: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, VINDEX 80 WG, COSAVET DF, COSINUS, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, POL-SULPHUR 80 WG, POL-SULPHUR 80 WP, POL-SULPHUR 800 SC, BIOTIP SULFO 800 SC ali SYBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO.

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju zaradi hitrih prirastov na 7 do 8 dni.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.



MKGP-UVHVVR KGZS-Zavod Novo mesto